FLYER ACARIUS 2014_Mise en page 1 18/12/13 14:47 Page1

ACARIUS 018 EC

ABAMECTINE 18 g/L

Insecticide Acaricide

cultures maraîchères et fruitières







GROUPE 3B - phlippe@groupe3b.fr
Photos : Bajstock.com / http://www.sxc.hu/

savana

BOUCHON SAVANA
savana
PRODUIT GARANTI

VOS CULTURES ONT DROIT AU MEILLEUR !

23 chemin de la forêt - 74200 - Thonon les Bains - France
Site Internet : www.savana-france.com



ACARIUS 018 EC

INSECTICIDE ACARICIDE

Cultures maraîchères et fruitières

PRATIQUES CULTURALES

Culture	Usage	Dose préconisée	Indications d'utilisation	Délai avant récolte	Délai de rentrée
Tomate, haricot vert, cucurbitacées	Acariens	0,5 l/ha	Traiter dès les 1ères infestations, ou dès le seuil de 3-5 formes mobiles atteint. Limite d'emploi : surveiller la culture et intervenir dès le seuil de nouveau atteint.	3 jours	6 heures
Aubergine, poivron, piment		1,2 l/ha			
Maïs doux					
PPAMC, plantes, parfum, arômes, médic Condim		1,25 l/ha			
Agrumes		0,75 l/ha	Limite d'emploi : 1 application/ha/an	10 jours	
Tomate	Thrips spp	0,5 l/ha	Traiter dès que les 1ères larves sont observées. Renouveler le traitement 7 jours plus tard. Limite d'emploi : Surveiller la culture et intervenir dès le seuil atteint de nouveau.	3 jours	
Haricot vert, poivron, piment, aubergine		1,2 l/ha			
PPAMC, plantes, parfum, arômes, médic Condim		1,25 l/ha			
Tomate	Mineuses	0,5 l/ha	Traiter dès les 1ères piqûres de nutrition ou pontes visibles. Limite d'emploi : si forte infestation, renouveler le traitement 7 jours plus tard.	3 jours	
Haricot vert, poivron, piment, aubergine		1,2 l/ha			
PPAMC, plantes, parfum, arômes, médic Condim		1,25 l/ha			
Agrumes		0,75 l/ha	Limite d'emploi : 1 application/ha/an	10 jours	

La dose moyenne d'emploi est 0,5l/ha.

MODE D'ACTION

ACARIUS 018 EC est un insecticide-acaricide foliaire qui peut être utilisé en préventif ou en curatif. Efficace même sur les souches d'acariens résistantes aux organophosphorés. Il agit par ingestion et dans une moindre mesure par contact sur les larves et les adultes. Ses propriétés translaminaires lui confèrent une efficacité accrue sur l'ensemble des ravageurs cibles (y compris ceux situés sous les feuilles), une grande persistance d'action (de l'ordre de 3-6 semaines). Pas de résistance croisée avec les autres insecticides-acaricides. Très bonne résistance au lessivage.

PREPARATION

Pour une utilisation à bas volume de pulvérisation, verser la quantité nécessaire dans l'appareil à moitié rempli d'eau. Compléter la cuve avec de l'eau et agiter le pulvérisateur régulièrement.

ENVIRONNEMENT

Respecte la faune auxiliaire.
Faible quantité de matière active à l'hectare.

Ne pas jeter sur la voie publique