GROUPE savana





savana
www.savana-france.com

MANGA PLUS®

Le fongicide indispensable !

- *Action multi sites : pas de résistance*
- *Efficace en préventif*
- *Efficacité reconnue par les professionnels*
- *Economique*

Composition
Mancozèbe : 800 g/kg

Famille chimique
Dithiocarbamates – FRAC-M3

Formulation
WP – Poudre mouillable

Mode d'action
Contact / Préventif

Cultures
Maraîchères et Fruitières

Cible
Champignons pathogènes

Mode d'application
Traiter en préventif. Renouveler le traitement tous les 7-14 jours selon la pression de la maladie.

Dose
2-3 Kg/ ha

Fongicide

Fongicide

MANGA PLUS®

Fongicide de contact pour les cultures maraîchères et fruitières

OBJECTIFS

Le traitement des cultures maraîchères, fruitières et vivrières contre les maladies est indispensable pour obtenir un bon rendement. Utiliser **MANGA PLUS** permet de protéger les cultures contre les champignons phytopathogènes susceptibles de s'y développer.

PRINCIPALES MALADIES VISÉES

MANGA PLUS permet de lutter efficacement contre de nombreuses maladies et notamment l'anthracnose, le mildiou et l'alternaria.

EXEMPLES :




Mildiou
(ex. : Tomate)




Alternariose
(ex. : Aubergine)



Anthracnose
(ex. : Poivron)



Cercosporiose
(ex. : Banane)



Rouille
(ex. : Poireau)

MODE D'ACTION

MANGA PLUS contient 800g/kg de mancozèbe, matière active fongicide de la famille des dithiocarbamates, groupe FRAC-M3.
MANGA PLUS est un fongicide préventif de contact qui inhibe la germination des spores en agissant au niveau des chaînes respiratoires et alimentaires des champignons. Son action est effective sur 6 sites cellulaires bloquant la perméabilité membranaire, la biosynthèse et la respiration cellulaire. Fongicide multisite, **MANGA PLUS** possède la propriété de ne pas favoriser l'apparition et la multiplication de souches résistantes de champignons.

MODE D'EMPLOI

Culture	Usage	Dose préconisée	Indications d'utilisation	Délai avant récolte	Délai de rentrée
Oignon, Ail, Echalotte, Carotte, Chou, Poireau	Rouille, Alternariose, Mildiou, Anthracnose, Botytis, Cladosporiose, Pied noir, Cercosporiose...	2-3 Kg/ha	Traiter en préventif. Renouveler le traitement tous les 7-14 jours selon la pression de la maladie.	30j	48h
Concombre, Courge, Courgette, Melon, Pastèque				3j	
Tomate, Aubergine, Haricot				7j (Aubergine) 14j (Tomate)	
Pomme de terre				7j	
Manguier, Agrumes, Bananier				30j	

Soit une quantité de 100-150g de **MANGA PLUS** dans 15l d'eau pour un volume de bouillie de 300l/ha.

Conseils d'utilisation : En traitement par pulvérisation, commencer par remplir la cuve à moitié avec de l'eau. Puis ajouter le volume adéquat de **MANGA PLUS** et agiter le pulvérisateur. Compléter la cuve avec de l'eau. Remuer le pulvérisateur régulièrement pendant le traitement.

Stockage : Le produit est stable et se conserve dans les conditions normales de stockage en entrepôt (à l'abri de la chaleur, du soleil, de la pluie). Conserver le produit dans son emballage d'origine bien fermé .

Précautions : Toutes les précautions habituelles concernant l'homme, l'environnement et l'utilisation du produit sont à suivre, selon les bonnes pratiques agricoles et la non-réutilisation des emballages.

savana
www.savana-france.com

Vos cultures ont droit au meilleur !

Flashez ce QR code pour en savoir plus sur nos produits